

**ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 8.**

# **MATEMATIKA**

## **EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA**

## **JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ**

**NEMZETI ERŐFORRÁS  
MINISZTERIUM**

---

---

## Fontos tudnivalók

### Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

### Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészeire előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

## I.

<b>1. a) első megoldás</b>		
A New York-i átlagfizetés $\frac{150\,000}{0,236}$ ( $\approx 635\,593$ ) forint,	2 pont	
ami $\frac{150\,000}{0,236 \cdot 190} \approx$	1 pont	
$\approx 3345$ \$-nak felel meg.	1 pont	<i>Ha a vizsgázó nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor ez a pont nem jár.</i>
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>1. a) második megoldás</b>		
150 000 Ft megfelel $\frac{150\,000}{190}$ ( $\approx 789,5$ ) dollárnak.	1 pont	
Ez 23,6%-a a New York-i átlagfizetésnek, amely így $\frac{150\,000}{190 \cdot 0,236} \approx$	2 pont	
$\approx 3345$ \$.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó 789 dollárral számolva 3343 \$-t kap eredményül. Ha a vizsgázó nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor ez a pont nem jár.</i>
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>1. b) első megoldás</b>		
New Yorkban 3345 \$-ért 100 kg vásárolható, ezért 1 kg ára 33,45 \$.	1 pont	<i>Forintban is elfogadható a számítás: 6356 Ft.</i>
Budapesten 1 kg árut ennek 70,9%-áért lehet vásárolni, azaz $33,45 \cdot 0,709$ ( $\approx 23,72$ ) \$-ért.	2 pont	<i>Más helyes kerekítés (pl. 23,7 \$) is elfogadható.</i>
Ez megfelel $33,45 \cdot 0,709 \cdot 190$ ( $\approx 4506$ ) Ft-nak.	1 pont	<i>Más, helyesen kerekített érték is elfogadható (pl. <math>23,7 \cdot 190 = 4503</math>).</i>
A budapesti átlagfizetésből ennyi pénzért $\frac{150\,000}{33,45 \cdot 0,709 \cdot 190} \approx$	2 pont	
$\approx 33,3$ kg terméket lehet vásárolni.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

<b>1. b) második megoldás</b>		
Ha a termék egységára $e$ \$/kg, akkor a 100 kg termékért $100e$ \$-t kell fizetni New Yorkban.	1 pont	
Ez egyben a New York-i átlagkereset is.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A termék egységára Budapesten $0,709e$ \$/kg,	1 pont	
az átlagkereset pedig $0,236 \cdot 100e$ \$, ami $23,6e$ \$.	1 pont	
Ennyi pénzért Budapesten $\frac{23,6e}{0,709e} \approx$	2 pont	
$\approx 33,3$ kg terméket lehet vásárolni.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

<b>1. b) harmadik megoldás</b>		
Ha a New York-i átlagfizetés $x$ \$, akkor a budapesti átlagfizetés $x \cdot 190 \cdot 0,236 = 44,84x$ Ft.	1 pont	
Az $x$ \$-os New-York-i átlagfizetésből ott 100 kg terméket tudunk venni, ezért 1 kg ára $\frac{x}{100}$ \$.	1 pont	
Budapesten 1 kg árut ennek 70,9%-áért lehet vásárolni, tehát $\frac{x}{100} \cdot 0,709 = 0,00709x$ dollárért.	1 pont	
Ez megfelel $0,00709x \cdot 190 = 1,3471x$ Ft-nak.	1 pont	
A budapesti átlagfizetésből tehát $\frac{44,84x}{1,3471x} \approx$	2 pont	
$\approx 33,3$ kg terméket lehet vásárolni.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

*Megjegyzés: Más, ésszerű (legfeljebb két tizedesjegy pontosságú) és helyesen kerekített érték (például 33 kg) is elfogadható válaszként.*

<b>2. a) első megoldás</b>		
(Jelölje $q$ a mértani sorozat hányadosát.) A negyedik helyezett 25, a harmadik $25q$ , a második $25q^2$ pontot ért el.	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Az első helyezett pontszáma $\frac{4}{3} \cdot 25q^2 = \frac{100q^2}{3}$ .	1 pont	
A szöveg szerint: $\frac{100q^2}{3} + 25q^2 + 25q + 25 = 139$ .	1 pont	
Összevonás és rendezés után: $175q^2 + 75q - 342 = 0$ .	1 pont	

Ennek két megoldása van: $a \frac{6}{5}$ , illetve $a - \frac{57}{35}$ .	1 pont	
Ez utóbbi a szövegnek nem felel meg (hiszen ekkor a pontszámok nem alkotnának monoton sorozatot),	1 pont	
tehát a 3. helyezett pontszáma 30, a másodiké 36, az első helyezetté pedig 48.	1 pont	
(Ellenőrzés:) A kapott pontszámok összege 139, tehát ezek valóban megoldásai a feladatnak.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

**2. a) második megoldás**

A második helyezett $x$ , az első $\frac{4}{3}x$ pontot ért el.	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A második $x$ , a negyedik 25 pontot ért el, így a mértani sorozat miatt a 3. helyezett pontszáma $\sqrt{25x}$ .	1 pont	
A szöveg szerint: $\frac{4}{3}x + x + \sqrt{25x} + 25 = 139$ .	1 pont	
Hárommal beszorozva és nullára rendezve egy $\sqrt{x}$ -ben másodfokú egyenletet kapunk: $7(\sqrt{x})^2 + 15\sqrt{x} - 342 = 0$ .	1 pont*	
Ennek pozitív gyöke $\sqrt{x} = 6$ (a negatív gyök $\sqrt{x} = -\frac{57}{7}$ , ami nem lehetséges),	1 pont*	
így $x = 36$ .	1 pont*	
Tehát a 2. helyezett pontszáma 36, a harmadiké 30, az első helyezetté pedig 48.	1 pont	
(Ellenőrzés:) A kapott pontszámok összege 139, tehát ezek valóban megoldásai a feladatnak.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

*A \*-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*


Rendezve: $5\sqrt{x} = 114 - \frac{7}{3}x$ . Ezt négyzetre emelve és nullára rendezve: $49x^2 - 5013x + 116\,964 = 0$ .	1 pont	
Ennek két megoldása van: $x_1 = \frac{3249}{49}$ ( $\approx 66,3$ ), ez azonban az eredeti négyzetgyökös egyenletnek ( $114 - \frac{7}{3}x < 0$ miatt) nem megoldása.	1 pont	
$x_2 = 36$ .	1 pont	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó (pl. próbálgatással) megadja a helyes pontszámokat, de nem mutatja meg, hogy a feladatnak nincs más megoldása, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.*

<b>2. b) első megoldás</b>		
A lehetséges (egyenlően valószínű) kimenetek száma: $\binom{20}{3} (= 1140)$ .	2 pont	<i>Nem bontható.</i>
A kedvező kimenetek száma: $\binom{4}{3} \cdot 5^3 (= 500)$ .	2 pont	
A kért valószínűség: $\frac{500}{1140} (\approx 0,439)$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>5 pont</b>	


<b>2. b) második megoldás</b>		
Az utalványok sorsolásának (a nyertesek sorrendjét is figyelembe véve) $20 \cdot 19 \cdot 18$ (egyenlően valószínű) kimenetele van.	2 pont	<i>Nem bontható.</i>
Először 20, majd 15, végül 10 főiskolából kell kiválasztani 1-1 résztvevőt, ezek lehetséges száma: $20 \cdot 15 \cdot 10$ .	2 pont	
a kért valószínűség $\frac{20 \cdot 15 \cdot 10}{20 \cdot 19 \cdot 18} = \frac{25}{57} (\approx 0,439)$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>5 pont</b>	

<b>3. a)</b>		
A kúp alapkörének sugara 6 (cm),	1 pont	
alkotójának hossza $6\sqrt{2} (\approx 8,49 \text{ cm})$ ,	1 pont	
térfogata $V = \frac{T \cdot m}{3} = \frac{6^2 \cdot \pi \cdot 6}{3} = 72\pi \approx 226 \text{ (cm}^3\text{)}$ ,	1 pont	
felszíne $A = r\pi(r + a) = 6\pi(6 + 6\sqrt{2}) = 36(1 + \sqrt{2})\pi \approx 273 \text{ (cm}^2\text{)}$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>3. b) első megoldás</b>		
 <p>Jó ábra.</p>	2 pont	<i>Ha a vizsgázó ábra nélkül is jól használja az adatokat a megoldása során, akkor is jár ez a 2 pont.</i>
Ha a beírt gömb sugara $\rho$ , akkor $\rho\sqrt{2} = 6 - \rho$ ,	1 pont	
amiből $\rho = 6(\sqrt{2} - 1) (\approx 2,49 \text{ cm})$ .	1 pont	

A lementszett kisebb kúp magassága $m_1 = 6 - \rho$ ( $\approx 3,51$ cm).	1 pont	
A lementszett kúp $V_1$ térfogatára (a hasonló testek térfogatának aránya miatt) felírható: $\frac{V_1}{V} = \left(\frac{m_1}{m}\right)^3 =$	1 pont	
$= \left(\frac{12 - 6\sqrt{2}}{6}\right)^3,$	1 pont	
amiből $V_1 = 72(2 - \sqrt{2})^3 \pi$ ( $\approx 45,5$ cm <sup>3</sup> ).	1 pont	
A csonkakúp térfogata tehát $\approx 181$ (cm <sup>3</sup> ).	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>9 pont</b>	

**3. b) második megoldás**

 <p>Jó ábra, amely tartalmazza a gömb sugarát (<math>\rho</math>), a <math>45^\circ</math>-os szöveget, és a síkmetszet sugarát (<math>r</math>).</p>	2 pont	<i>Ha a vizsgázó ábra nélkül is jól használja az adatokat a megoldása során, akkor is jár ez a 2 pont.</i>
$\rho = 6 \cdot \operatorname{tg} 22,5^\circ,$	1 pont	
amiből $\rho \approx 2,49$ (cm).	1 pont	
A $KCE$ egyenlő szárú derékszögű háromszögből $r = 6 - \rho,$	1 pont	
azaz $r \approx 3,51$ (cm).	1 pont	
A csonkakúp magassága (megegyezik a gömb sugarával): $m \approx 2,49$ (cm).	1 pont	
A csonkakúp térfogata: $V = \frac{m\pi}{3}(R^2 + Rr + r^2) \approx$ $\approx \frac{2,49\pi}{3}(6^2 + 6 \cdot 3,51 + 3,51^2) \approx$	1 pont	<i>A képletért önmagában nem, csak a jó behelyettesítésért jár ez a pont.</i>
$\approx 181$ (cm <sup>3</sup> ).	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>9 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó valamelyik válaszában nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor a feladatban összesen legfeljebb 1 pontot veszítsen.*

*Ha a vizsgázó a beírt gömb sugarának meghatározásakor elvi hibát követ el (például a gömb középpontját a magasság felezőpontjának tekinti), akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.*

<b>4. a)</b>		
Ha $p = 3$ , akkor $f(x) = -3x^3 + 9x - 6$ .	1 pont	
$\int_0^2 (-3x^3 + 9x - 6)dx = [-0,75x^4 + 4,5x^2 - 6x]_0^2 =$	2 pont	<i>A primitív függvény megjelenítése nélkül ez a 2 pont nem jár.</i>
$= -6$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>4. b)</b>		
$-3 + (p - 3) + p^2 - 6 = 0$ .	1 pont	
Rendezve: $p^2 + p - 12 = 0$ .	1 pont	
Ennek megoldásából adódik, hogy $p = 3$ vagy $p = -4$ esetén lesz a megadott függvénynek zérushelye az 1.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>3 pont</b>	

<b>4. c)</b>		
A deriváltfüggvény hozzárendelési szabálya: $f'(x) = -9x^2 + 2(p - 3)x + p^2$ .	2 pont	
Ennek az $x = 1$ -hez tartozó helyettesítési értéke: $p^2 + 2p - 15$ .	1 pont	
Megoldandó tehát a $p^2 + 2p - 15 > 0$ egyenlőtlenség.	1 pont	
A $p^2 + 2p - 15 = 0$ egyenlet megoldásai a 3 és a $-5$ ,	1 pont	
s mivel a $p^2 + 2p - 15 > 0$ egyenlőtlenség bal oldalán álló polinom főegyütthatója pozitív,	1 pont	<i>Ez a pont jár más helyes indoklás (pl. jó ábra) esetén is.</i>
ezért az egyenlőtlenség akkor teljesül, ha $p < -5$ vagy $p > 3$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

## II.

<b>5. a)</b>		
Ha $a$ jelöli a négyzetes oszlop alapélének hosszát, és $k$ darabból készítjük a hasábokat, akkor $H_1$ felszíne: $A_{H_1} = 2 \cdot 2a^2 + 2 \cdot k \cdot a^2 + 2 \cdot k \cdot 2a^2 (= 2a^2(3k + 2))$ .	2 pont	
$H_2$ felszíne: $A_{H_2} = 2a^2 + 4 \cdot k \cdot 2a^2 (= 2a^2(4k + 1))$ .	2 pont	
Az $\frac{A_{H_1}}{A_{H_2}} = 0,8$ feltételből ( $2a^2$ -tel történő egyszerűsítés és rendezés után): $3k + 2 = 0,8 \cdot (4k + 1)$ .	2 pont	
Az egyenlet megoldása $k = 6$ ,	1 pont	



tehát 6-6 négyzetes oszlopot használtunk a hasábok építéséhez.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó (pl. próbálgatással) megadja a jó eredményt, de nem bizonyítja, hogy más megoldás nincs, akkor legfeljebb 3 pontot kaphat.*

<b>5. b) első megoldás</b>		
$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(3n+5)(4n+1)}{(4n+5)(3n+2)} =$	1 pont	
$= \frac{12n^2 + 23n + 5}{12n^2 + 23n + 10} \left( = 1 - \frac{5}{12n^2 + 23n + 10} \right).$	1 pont	
A fenti hányados minden pozitív egész $n$ esetén 1-nél kisebb,	1 pont	
és a sorozat minden tagja pozitív,	1 pont	
ezért a sorozat szigorúan monoton csökkenő.	1 pont	
Ebből következik, hogy a sorozat felülről korlátos.	1 pont	
Mivel a sorozat minden tagja pozitív, ezért a sorozat alulról is korlátos,	1 pont	
tehát a sorozat korlátos.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

<b>5. b) második megoldás</b>		
Vizsgáljuk az $a_{n+1} - a_n$ különbséget!	1 pont	
$\frac{3n+5}{4n+5} - \frac{3n+2}{4n+1} =$	1 pont	
$= \frac{12n^2 + 23n + 5 - 12n^2 - 23n - 10}{(4n+5)(4n+1)} = -\frac{5}{(4n+5)(4n+1)}.$	1 pont	
A kapott tört minden pozitív egész $n$ esetén negatív,	1 pont	
ezért a sorozat szigorúan monoton csökkenő.	1 pont	
A $\left\{ \frac{3n+2}{4n+1} \right\}$ sorozat konvergens (határértéke 0,75),	1 pont	
s mivel minden konvergens sorozat korlátos,	1 pont	
tehát a sorozat egyben korlátos is.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

<b>6. a) első megoldás</b>		
Az $A, B$ sorrendje az első 2 helyen kétféleképpen alakulhatott.	1 pont	
A $D$ osztály a 3., 4., és 5. hely bármelyikén végezhetett, ez 3 lehetőség.	1 pont	
A $C, E, F$ osztályok a fennmaradó három helyen 3!-féle sorrendben végezhettek.	1 pont	
A különböző lehetőségek száma tehát $2 \cdot 3 \cdot 3! = 36$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>6. a) második megoldás</b>		
Az $A, B$ sorrendje az első 2 helyen kétféleképpen alakulhatott.	1 pont	
A $C, D, E, F$ osztályok a fennmaradó négy helyen $4!$ -féle sorrendben végezhettek.	1 pont	
Előzőek közül nem megfelelő, amikor $D$ az utolsó, ez $3!$ -féleképpen fordulhat elő.	1 pont	
A különböző lehetőségek száma tehát $2 \cdot (4! - 3!) = 36$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>6. b) első megoldás</b>		
Az összes eset felében az $E$ osztály megelőzi $F$ -et, a másik felében pedig $F$ előzi meg $E$ -t.	2 pont	
A megfelelő esetek száma tehát $\frac{6!}{2} = 360$ .	2 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

<b>6. b) második megoldás</b>		
Ha az $E$ osztály első, akkor az $F$ osztály 5-féle, ha az $E$ második, akkor az $F$ 4-féle, ha az $E$ harmadik, akkor az $F$ 3-féle, ha az $E$ negyedik, akkor az $F$ 2-féle, végül ha az $E$ ötödik, akkor az $F$ osztály csak 1-féle helyen végezhetett. Ez összesen 15 lehetőség.	2 pont*	$E$ és $F$ $\binom{6}{2} = 15$ -féle helyre kerülhet, ezeken belül $E$ és $F$ sorrendje rögzített.
A maradék négy helyen az $A, B, C$ és $D$ osztályok $4! = 24$ -féleképpen végezhettek.	1 pont	
A megfelelő esetek száma tehát $15 \cdot 24 = 360$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

*A \*-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatért is megkaphatja a vizsgázó:*

*$A, B, C$  és  $D$  bármely rögzített sorrendje esetén 5 helyre lehet az  $E$  és  $F$  osztályt elhelyezni.*

*Az 5 hely közül 2-t ismétléssel (hiszen  $A, B, C$  és  $D$  egy rögzített sorrendjén belül ugyanoda is*

*kerülhet  $E$  és  $F$ ) kiválasztva a lehetőségek száma:  $\binom{5+2-1}{2} = \binom{6}{2} = 15$ . (Mindegyik kiválasztáshoz pontosan egy olyan eset tartozik, amelyben az  $E$  osztály megelőzi az  $F$ -et.)*

<b>6. c)</b>		
Az $A$ csapat a $B$ ellen vesztett, a többi mérkőzését megnyerte (nincs döntetlenje).	1 pont	
Az $F$ -nek nincs egyetlen pontja sem, tehát ők nem érhettek el döntetlent.	1 pont	
A $B, C, D, E$ csapatok egymás ellen összesen 6 mérkőzést játszottak,	1 pont	
ebből (az összes mérkőzés harmada) 5 végződött döntetlenre.	1 pont	

A B csapat a C, D, E elleni 3 mérkőzésből 3 pontot ért el, tehát vagy 1 győzelme, 1 döntetlenje és 1 veresége vagy pedig 3 döntetlenje volt.	2 pont*	
Ha 1 győzelme és 1 veresége lenne B-nek, akkor a B, C, D, E csapatok egymás elleni 6 mérkőzésből legfeljebb 4 végződhetett volna döntetlennel.	1 pont*	
Ez azonban nem lehetséges, tehát B mindhárom mérkőzése, így a D elleni is döntetlen lett.	1 pont*	
<b>Összesen:</b>	<b>8 pont</b>	

A \*-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:

Az egyes csapatok az egymás elleni 3-3 mérkőzésük-ből a következő pontokat szerezték: a B osztály 3 pontot, a C 4-et, a D 3-at és az E 2 pontot.	1 pont	
Mivel csak egy mérkőzés volt ezek közül, amelyik nem döntetlenre végződött,	1 pont	
ezért csak a C nyerhette meg az E osztály elleni találkozóját.	1 pont	
A B és D közötti mérkőzés tehát valóban döntetlenre végződött.	1 pont	

*Megjegyzés: A mérkőzések eredményét mutatja az alábbi táblázat, amelyben a mérkőzésen győztes csapat neve, illetve a döntetlen eredmény látható. Ha ezt a táblázatot (vagy egy ezzel egyenértékű eredményleírást) elkészíti a vizsgázó, de nem indokolja, hogy másképpen nem tölthető ki a táblázat, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.*

	A	B	C	D	E	F	pont
A		B	A	A	A	A	8
B	B		dönt.	dönt.	dönt.	B	7
C	A	dönt.		dönt.	C	C	6
D	A	dönt.	dönt.		dönt.	D	5
E	A	dönt.	C	dönt.		E	4
F	A	B	C	D	E		0

<b>7. első megoldás</b>		
Mivel a (2; 6) pont rajta van az egyenesen, azért $6 = 2a + b$ , tehát $b = 6 - 2a$ .	1 pont	$a = 3 - \frac{b}{2}$ (mivel $a < 0$ , ezért $b > 6$ )
Ezzel az egyenes egyenlete: $y = ax + 6 - 2a$ .	1 pont	$y = \left(3 - \frac{b}{2}\right)x + b$
Ez az egyenes az $x$ tengelyt a $P\left(2 - \frac{6}{a}; 0\right)$ pontban,	1 pont	$P\left(\frac{2b}{b-6}; 0\right)$
az $y$ tengelyt a $Q(0; 6 - 2a)$ pontban metszi.	1 pont	$Q(0; b)$

Mivel $a < 0$ , ezért $2 - \frac{6}{a}$ és $6 - 2a$ is pozitív.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha jó ábrát készít és azon a <math>P</math> és <math>Q</math> pontok a tengelyek pozitív felén helyezkednek el.</i>
A levágott háromszög területe: $T(a) = \frac{1}{2} \left( 2 - \frac{6}{a} \right) (6 - 2a)$ .	1 pont	$T(b) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b}{b-6} \cdot b$
A szorzásokat elvégezve kapjuk, hogy $T(a) = 12 - 2a - \frac{18}{a}$ .	1 pont	$T(b) = \frac{b^2}{b-6}$
Ennek ott lehet minimuma, ahol az $a \mapsto T(a)$ ( $a < 0$ ) függvény deriváltja nulla.	1 pont*	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$T'(a) = -2 + \frac{18}{a^2}$ ,	2 pont*	$T'(b) = \frac{b^2 - 12b}{(b-6)^2}$
ez 0, ha $a = 3$ vagy $a = -3$ .	1 pont*	$b = 0$ vagy $b = 12$
Mivel $a < 0$ , azért $a = -3$ .	1 pont*	
Ez valóban minimumhely, mert $T''(-3) > 0$ .	1 pont*	
Ha $a = -3$ , akkor $b = 12$ .	1 pont	
A keresett egyenes egyenlete: $y = -3x + 12$ .	1 pont	
A legkisebb terület 24 egység.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>16 pont</b>	

*A \*-gal jelölt 6 pontot a következő gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*

Mivel $a < 0$ , ezért $0 < -a$ , így a $T(a) = 12 + 2 \cdot (-a) + \frac{18}{(-a)}$ kifejezés utolsó két tagja pozitív.	2 pont	
Ezért alkalmazhatjuk rá a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget:	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$T(a) = 12 + 2 \cdot (-a) + \frac{18}{(-a)} \geq$ $\geq 12 + 2 \cdot \sqrt{2 \cdot (-a) \cdot \frac{18}{(-a)}} = 12 + 2 \cdot \sqrt{36} = 24$ .	2 pont	
Egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha $2 \cdot (-a) = \frac{18}{(-a)}$ , azaz ha $a = -3$ .	1 pont	

<b>7. második megoldás</b>		
A $Q$ pont második koordinátája $b$ , és legyen a $P$ pont első koordinátája $x$ ( $b > 6$ és $x > 2$ ).	1 pont	
<p>A <math>(2; 6)</math> ponton át párhuzamost húzunk a tengelyekkel, és az <math>OPQ</math> háromszög területét a kapott két kisebb háromszög és a téglalap területének összegeként írjuk fel:</p>	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$\frac{(x-2) \cdot 6}{2} + \frac{(b-6) \cdot 2}{2} + 12 =$	1 pont	
$= 3x + b.$	1 pont	
(A hasonló derékszögű háromszögek miatt:) $\frac{x-2}{6} = \frac{2}{b-6},$	1 pont	
ahonnan $b = \frac{12}{x-2} + 6.$	1 pont	
Ezt visszaírva a területre kapott kifejezésbe: $T(x) = 3x + \frac{12}{x-2} + 6.$	1 pont	
Ennek ott lehet minimuma, ahol az $x \mapsto T(x)$ ( $x > 2$ ) függvény deriváltja nulla.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$T'(x) = 3 - \frac{12}{(x-2)^2}.$	2 pont	
ez 0, ha $x = 0$ vagy $x = 4.$	1 pont	
Mivel $x > 2$ , azért $x = 4.$	1 pont	
Ez valóban minimumhely, mert $T''(4) > 0.$	1 pont	
Ha $x = 4$ , akkor $b = 12$ és a $QP$ egyenes meredeksége $-3.$	1 pont	
A keresett egyenes egyenlete: $y = -3x + 12.$	1 pont	
A legkisebb terület 24 egység.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>16 pont</b>	

<b>8. a)</b>		
Az egyenlően valószínű kimenetek száma: $\binom{50}{10}$ .	1 pont	
A kedvező kimenetek száma: $\binom{45}{10} + \binom{45}{9} \binom{5}{1}$ .	2 pont	
A kért valószínűség: $\frac{\binom{45}{10} + \binom{45}{9} \binom{5}{1}}{\binom{50}{10}} \approx$	1 pont	
$\approx 0,742$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>5 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó indoklás nélkül binomiális eloszlással számol, akkor legfeljebb 1 pontot kaphat. Ha említi, hogy az így kapott eredmény közelítés, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat.*

<b>8. b)</b>		
0,9 annak a valószínűsége, hogy az első gépsoron készült pohár jó.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A kért valószínűség $\binom{15}{2} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^{13} \approx$	2 pont	
$\approx 0,267$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>4 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó nem a megfelelő modellt használja (például hipergeometrikus eloszlást használ), akkor erre a részre nem kaphat pontot.*

<b>8. c) első megoldás</b>		
Jelölje $A$ azt az eseményt, hogy az első gépsoron készült a pohár, $B$ pedig azt az eseményt, hogy selejtes a pohár.	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$P(A B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ .	1 pont	
$P(AB) = 0,6 \cdot 0,1 = 0,06$ .	1 pont	
Ha összesen $n$ darab pohár van, akkor $0,6 \cdot n \cdot 0,1 + 0,4 \cdot n \cdot 0,04 = 0,076n$ darab selejtes van közöttük.	2 pont*	
Egy selejtes választásának valószínűsége: $P(B) = \frac{0,076n}{n} = 0,076$ .	1 pont*	
Tehát $P(A B) = \frac{0,06}{0,076} \approx 0,789$ .	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

$A$  \*-gal jelölt 3 pontot a következő gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:

Ha $\bar{A}$ jelöli azt az eseményt, hogy a második gépsoron készült a pohár, akkor $P(B) = P(B A) \cdot P(A) + P(B \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) =$	1 pont	
$= 0,1 \cdot 0,6 + 0,04 \cdot 0,4 = 0,076.$	2 pont	

### 8. c) második megoldás

Az $n$ db elkészült pohár között $0,6n$ az első gépsoron és $0,4n$ a második gépsoron készült.	2 pont	
Az első gépsoron készült $0,6n$ pohár között a selejtesek száma $0,6n \cdot 0,1 = 0,06n$ ,	1 pont	
a második gépsoron készült $0,4n$ pohár között a selejtesek száma $0,4n \cdot 0,04 = 0,016n$ .	1 pont	
Az összes selejtes pohár száma tehát $0,076n$ .	1 pont	
Ezek közül egyet választva $\frac{0,06n}{0,076n} \approx 0,789$ a valószínűsége annak, hogy az első gépsoron készült selejtes poharat választottunk.	2 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>7 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy konkrét  $n$  értékkel helyesen számol, akkor is teljes pontszámot kaphat.*

### 9. a)

Ha $d$ a számtani sorozat differenciája, akkor a háromszög oldalhosszai $4, 4 + d, 4 + 2d$ (és $0 < d$ ).	1 pont	
A háromszög derékszögű, ezért $4^2 + (4 + d)^2 = (4 + 2d)^2$ .	1 pont	
A négyzetre emeléseket elvégezve, rendezés után kapjuk: $3d^2 + 8d - 16 = 0$ .	1 pont	
A másodfokú egyenlet gyökei: $d_1 = -4, d_2 = \frac{4}{3}$ .	1 pont	
A negatív gyök nem ad megoldást, tehát a háromszög oldalai $4, \frac{16}{3}$ és $\frac{20}{3}$ egység hosszúak.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>5 pont</b>	

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó (pl. próbálgatással vagy a 3, 4, 5 pitagoraszi számhármassal) megadja a háromszög oldalainak hosszát, de nem mutatja meg, hogy a feladatnak nincs más megoldása, akkor 2 pontot kaphat.*

<b>9. b)</b>		
(Indirekt módon bizonyítunk.) Tegyük fel, hogy van $60^\circ$ -os szöge a háromszögnek.	1 pont	
Mivel az oldalak páronként különböző hosszúságúak, és nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van,	1 pont*	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
ezért ha van $60^\circ$ -os szög, akkor az a $4 + d$ hosszúságú oldallal szemközt van.	2 pont*	
Erre az oldalra felírva a koszinusztételt: $(4 + d)^2 = 4^2 + (4 + 2d)^2 - 2 \cdot 4 \cdot (4 + 2d) \cdot \cos 60^\circ$ .	2 pont	
$16 + 8d + d^2 = 16 + 8d + 4d^2$	1 pont	
Ebből $d^2 = 0$ , azaz $d = 0$ .	1 pont	
Ez viszont ellentmond annak, hogy a háromszög nem szabályos ( $d > 0$ ).	2 pont	
Az eredeti feltételezésünk tehát hamis, azaz a háromszögnek valóban nincs $60^\circ$ -os szöge.	1 pont	
<b>Összesen:</b>	<b>11 pont</b>	

A \*-gal jelölt 3 pont jár, ha a vizsgázó a 4 és a  $4 + 2d$  egység hosszú oldalakra is felírja a koszinusztételt és helyes gondolatmenettel azokban az esetekben is ellentmondásra jut.

*Megjegyzés: Teljes pontszám jár az alábbi gondolatmenetért is.*

*Indirekt tegyük fel, hogy van a háromszögnek  $60^\circ$ -os szöge a  $4 + d$  hosszú oldallal szemben. Ha ekkor a 4 egység hosszú oldallal szemben  $0 < \alpha < 60^\circ$ , akkor a  $4 + 2d$  egység hosszú oldallal szemben  $120^\circ - \alpha$  nagyságú szög lesz. (4 pont)*

*A szinusztételt felírva 2-2 oldalra:*

$$\frac{\sin(120^\circ - \alpha)}{\sin \alpha} = \frac{4 + 2d}{4}, \text{ illetve } \frac{\sin 60^\circ}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \alpha} = \frac{4 + d}{4}.$$

*Mindkettőből (addíciós tételek segítségével)  $d$ -t kifejezve:*

$$d = \sqrt{3} \operatorname{ctg} \alpha - 1, \text{ illetve } d = \frac{2\sqrt{3}}{\sin \alpha} - 4. \text{ (4 pont)}$$

*Ezeket egymással egyenlővé téve és rendezve:*

$$1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha = \sin(\alpha + 30^\circ).$$

*Ez azonban ellentmondás, mert semmilyen  $0 < \alpha < 60^\circ$  esetén nem teljesülhet. Az eredeti feltételezésünk tehát hamis, azaz a háromszögnek valóban nincs  $60^\circ$ -os szöge. (3 pont)*